

หากผู้ป่วยสวมใส่ตาปลอมเฉพาะบุคคลแล้วรู้สึกไม่พอดีกับรื่องตาสามารถแก้ไขตาปลอมด้วยตนเองได้หรือไม่?


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


หากผู้ป่วยสวมใส่ตาปลอมเฉพาะบุคคล แล้วรู้สึกไม่พอดีกับรื่องตา สามารถแก้ไขตาปลอมด้วยตนเองได้หรือไม่?



ตอบ : ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
เพราะอาจทำให้เบ้าตาอักเสบ
เกิดขี้ตามาก เบ้าตาหรือรื่องตาหลุด
และไม่สามารถใส่ตาปลอมได้ในระยะยาว



หมายเหตุ: ควรปรึกษาแพทย์
หรือศูนย์ที่ทำตาปลอม
และแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesis.com


ศูนย์รักษาเทียม
ศิริราชพยาบาล


หาหมอเทียม


Siriraj Ocular Prosthetic Center

ตอบ : ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะอาจทำให้เบ้าตาอักเสบเกิดขี้ตามาก เบ้าตาหรือรื่องตาหลุด และไม่สามารถใส่ตาปลอมได้ในระยะยาว

หมายเหตุ: ควรปรึกษาแพทย์หรือศูนย์ที่ทำตาปลอม และแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามหรือนัดหมาย โทร. 02-419-7399 , 0-2419-4117 , 098-984-7714 (วัน เวลาราชการ)